

# ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN POR VÍA TRANSDÉRMICA

## Objetivo

- ✓ Administrar fármacos a través de la superficie cutánea a la superficie sistémica.

## Material

- ✓ Gasas.
- ✓ Guantes.
- ✓ Parche adhesivo.

## Procedimiento

- ✓ Informar al paciente de la técnica a realizar.
- ✓ Proporcionar intimidad.
- ✓ Lavar manos y poner guantes desechables.
- ✓ Limpiar la zona donde se va a colocar el parche con agua y secar bien.
- ✓ Aplicar el parche adhesivo sobre la piel y presionar con la palma de la mano durante aproximadamente unos 30 segundos.
- ✓ Retirar guantes y lavar las manos.

## Observaciones

- ✓ Elegir una zona de la piel de la parte superior del tronco o del brazo que se encuentre intacta, sana y sin vello. No puede haber heridas diminutas, ni tampoco signos de eritema, quemadura o radiación.
- ✓ Si se necesita recortar el vello residual hacerlo con tijeras ( no afeitar, ya que se altera la piel).
- ✓ Evitar la aplicación de fuentes directas de calor externo sobre el lugar de aplicación del parche.
- ✓ Rotar las zonas de aplicación.
- ✓ Educar al paciente y/o familia.
- ✓ Antes de administrar el fármaco asegurarse de la "regla de los 5 correctos":
  - Fármaco correcto.
  - Dosis correcta.
  - Vía correcta.
  - Hora correcta.
  - Paciente correcto.

## Bibliografía

- ✓ Monográfico del parche transdérmico de Fentanilo, Durogesic®.
- ✓ <http://www.cuidanet.com/dolor1.htm>.

## Autores

- ✓ Comisión de Revisión de Procedimientos de Enfermería.